

**PETRI ARDUINI ...
ANIMADVERSIONUM
BOTANICARUM
SPECIMEN: 1**



(111)

CLARISSIMO DOCTISSIMOQUE VIRO

JOHANNI MARSILIO

PHILOSOPHIÆ ET MEDICINÆ DOCTORI

SOC. REG. SCIENTIAR. ET REG. ANTIQUARIOR. LONDIN.

ET CÆSAR. PHYSICO-BOTANICÆ FLORENT. SODALI

IN PATAVINO GYMNASIO

BOTANICES PROFESSORI

PUBLICIQUE HORTI PRÆSIDI

PETRUS ARDUINUS

S. D.



UM intellexi, te a Sapientissimis Rei
nostræ Litterariæ Triumviris Pata-
vini hujus Horti Præsidem, ac Bo-
tanices Professore designatum, tanta animi
lætitia sum affectus pro meo singulari in te
studio, tuæque Humanitatis, ac Doctrinæ ad-
mi-

A 2

mi-

miratione, ut meum hoc Opusculum tibi inscriptum extare voluerim, monumentum qualecumque gratulationis meæ. Hunc tu, quo nuper auctus es, honorem, diuturnis, & assiduis universæ Philosophiæ studiis, sumptuosisque ad eam excolendam itineribus es consecutus. Litteraria Respublica, in qua fama tui nominis late pervagatur, dignum te Julii Pontederæ (cui ego plurimum debeo) immortalis Viri Successorem agnoscet. Nunc utique Botanicæ Scientiam, Humano Generi perjuvandam, atque perutilem, nostro etiam sub Cœlo ad summum veluti fastigium perventuram speramus, quæ Optimi Principis munificentia nunc quam maxime cum ceteris Disciplinis fovetur, & a te Clarissimo Doctissimoque Viro docebitur; atque in dies magis non modo a Medicinæ Studiosis, sed a Nobilissimis ac politissimis quibusque viris impense coletur. Quis ignorat Patroni mei Humanissimi Marci Cornelii Torcellensis Episcopi Botanicum Hortum Marlinghianum in Agro Tarvisino? cujus, credo, amœnitas Eiusdem etiam Musam excitavit, ut elegantissimum de amoribus Plantarum, secundum Sexuale Systema, Carmen conscriberet. Quem vero latet, quid admirabili, singularique ingenio, maximisque impensis in eodem studio colendo fovendoque perfecit Me-
 cœ-

cœnas meus Vir Patritius Philippus Farsetti ad Salam in Agro Patavino? Ibi enim omnes pæne, tam indigenarum, quam exoticarum Arborum, Herbarum, Florum, Fructuumque Species, pulchro ordine per ingens terræ spatium distributæ, Studiosis, atque Curiosis spectaculo sunt, una cum magnis, exornatisque Calidariis, Tepidariis, & Frigidariis (ut vocant), quæis calidiorum climatum incolæ Stirpes, & difficilioris cultus egentes educantur, & adservantur. Verum ne Venetiis quidem Horti defunt omnigenis plantis divites, florentissimique, uti apud Franciscum Patarolum Civem Doctrina, morumque suavitate præstantem; atque apud clarissimum Philosophiæ, & Medicinæ Doctorem Leonardum Seslerum Horti Historiographum videre est. Hi omnes & Botanicen optime norunt, & ipsius Cultores, meque, ut tu ipse facis, diligunt, omnique benevolentia genere complectuntur. Tuo itaque, ipsorumque tam præclaro ductus exemplo, Scientiam hanc magis magisque amplexari conabor ad ejusdem splendorem, vestris auspiciis, me quoque nonnihil conferre posse non desperans. Utinam & Fossilis Regni Scientia, quam Johannes frater meus, Vicetinis præsertim carus, tibi, aliisque Doctis quamplurimis non omnino ignotus, summopere colit, similes Patro-

nos

nos haberet. Is enim, cum non Geometriæ tantum, sed & Chemiæ metallurgicæ, Mineralogiæ, Tellurisque Theoriæ maxime deditus semper fuerit, varia Germaniæ, & Italiæ loca, præsertim montana, mineralibus, & marinis petrificatis referta perlustravit; multa tentamina (quibus etiam ego aliquando adfui) & observationes pæne innumeras fecit, ut Terræ structuram, Fossiliumque naturam detegeret. Quædam ex suis inventis, & observationibus patefecit in suis litteris hoc anno Venetiis editis, atque Sexto Tomo Novæ Callogerianæ Opusculorum Collectionis insertis; plura dumtaxat indicavit. Sequi ergo Fratrem me cogit indolis ab Stirpe similitudo, extimulat amor. Interim meum hoc Plantarum Specimen Typis committo, quod si tibi eruditissimo Viro probabitur, majora, te Duce atque Auspice, aliquando conabimur. Vale.

MO-

M O N I T U M.

B E N E V O L E L E C T O R.

V Egetabilis Regni Scientiæ quadam naturæ propensione percupidus, adolescens adhuc Plantas omnes, mihi quærenti occurrentes, & colligere, & observare institueram. Quum autem mihi contigisset, ut Doctissimo, ac Celeberrimo Viro Johanni Francisco Seguierio in Botanicis peregrinationibus per Baldum montem comes essem, prima ab ipso Botanices rudimenta accepi, & clarissimo Julio Pontedera, Viro immortalis nominis, ejus amico commendatus, & Patavium ascitus, Plantarum hujus Publici Horti commissam mihi custodiam suscepi. Tunc, & ipso celeberrimo Pontedera Præside mihi perhumaniter favente, & postquam, eo vita functo, ab Amplissimis Patavini Gymnasii Moderatoribus mihi uni hujus Horti, & Plantarum ipsius Indicem scribendi cura demandata fuit, id semper potissimum habui, ut si quid otii supererat, in observandis, & attente examinandis ejusdem Horti Plantis impenderem. Cui quidem rei cum navarem operam, contigit ut nonnullas novarum Stirpium species, ab aliis nunquam (ni fallor) nec descriptas, neque memoratas detegerem, pluresque alias ab aliquo Scriptore Botanico memoratas quidem, sed quarum icon, atque descriptio adhuc desiderabatur. Quare Botanices Studiosis me gratificaturum putans, leve aliquod animadversio-num mearum specimen exhibere statui; ideoque aliquot ex iis Plantis descripsi. Quod accuratius ut facerem, ipsemet easdem, quoad
inge-

ingenium meum ferre potuit, delineavi, atque in æs incidi, ne quid in iconibus hic exhibitis ad eas probe dignoscendas necessarium omitteretur. In tradendis tum nominibus, tum descriptionibus, eximii Botanorum Principis Caroli Linnæi methodum sequi placuit. Ceterum non paucas meas observationes ad quamplurimas alias Stirpes spectantes, in aliud tempus reservare expedit, tum quia accuratiori egent examine, præcipue in locis ubi sponte nascuntur, tum quoniam nimis fatigarer impensis, quas nequaquam vires meæ ferre nunc possent, si susceptum opus vellem perficere. Si enim unquam fors mihi, uti exopto, arriiserit, ut per hæc nostras regiones Botanicam peregrinationem aggredi possim, nihil intentatum me relicturum spero, & ut complures Stirpes, quæ nunc fere negliguntur, e tenebris eruatæ, in lucem proferantur; & ut Italis amplius exprobari nequeat, quod magis aliarum Regionum Plantis, quam suarum propriis addicti, Italie Plantas eo studio ac diligentia, qua opus est, nondum examinarint. atque descripserint. Tu interim, Humanissime Lector, hoc, qualecunque sit, Opusculum æqui bonique facias, & faveas industria meæ, Vale.

SALVIA caule fructuoso, foliis ovato--sinuatis, crenatis, rugosis, hirsutis. Tab. I.

Peregrina est hæc Saliæ species, deque ejus patria certi nihil affirmare possum. Quatuor vel quinque ab hinc annis, e seminibus peregrinis in Horto Patavino nata est atque alta. Ejus figuram & descriptionem nullibi reperire potui, licet Auctores multos præcipuos, qui Botanice pertractarunt, diligenter evolverim. Quamobrem eam hic referre statui ut novam Saliæ speciem, quæ mihi visâ est digna, quæ omnibus Botanicis studiosis innotesceret. Tota planta viscida, pilosa, & odorata est; summitati autem pilorum adhæret gutta limpida & viscosa, quæ totam plantam glutinosam reddit.

Caulem habet, pro ætatis ratione, nunc bipedalem, nunc tripedalem, erectum, fructicosum, in multos ramos divisum, quadrangulos initio, densis pilis obsitos, qui deinde in ligneam substantiam transeuntes quadraturam amittunt, teneriores autem rami & quadraturam & pilos retinent.

Ramuli hujusce plantæ nascuntur adversi, decussatim, seu cruciato situ, diviso & subdiviso, modo erecti, modo deflexi; foliis oppositis ad similem situm locatis, ovato--sinuatis, crenatis, rugosis, petiolatis, hirsutis, petiolis canaliculatis, persistentibus.

Extremos ramulos ambiunt verticillatim fere seni caliculi, pediculis brevibus donati.

Calyces maturi, qui interdum decidere solent (vid. figuram marginalem 2.) tubulati, striati, superne sensim ampliati, parum compressi, hirsuti, bilabiati; superiori labio tridentato, denticulis parvis breviter aristatis (b.b.b.): inferiori vero profundius bidentato (c.c.): denticulis aristatis: e quibus flores egrediuntur, brevi tubo, vix calyces superante, (vid. fig. 3.) hiantes, segmento superiori (d.) concavo, incurvo, emarginato; sub quo stylus brevior latet, in corniculos duos reflexos abiens: subter stylum vero stamina duo

B

lon-

longiora locantur, utraque ex quadam lingula e fauce corollæ prodeunte enata, quæ scilicet lingula iisdem staminibus clavi instar affigitur; extremitates superiores filamentorum (vid. fig. 5. 6. g. g. g.) Antheris linearibus luteolis terminantur, extremitates inferiores dilatantur, (vid. fig. 5. 6.) & in ima parte spuris Antheris notantur (h. h. h. h.); inferius vero labium tripartitum est (vid. fig. 7. a. a. a.) Lacinia media majore, subrotunda, concava, emarginata.

Quæ ut clarius appareant, in figura 7. flos inferiori parte explicata seorsum appictus est. (fig. 6.) stamina juniora ostendit, quæ magis reflexa sunt, & apicibus crassioribus donantur, quæque in sui medio lingulas utrinque habent (f. f.) flori non connexas. (in fig. 5.) conspiciuntur eadem stamina perfecta, ubi magis erecta sunt, cum lingulis suis; quæ ut superius dixi, clavi instar staminibus inferuntur. (fig. 8.) stylum cum germine annexo demonstrat.

Cæterum flores pediculis brevibus hærent, & singulis verticillis binæ subfunt bractææ foliaceæ, cordato — acuminatæ, virentes (vid. fig. 1. A. A.) . Semina quatuor subrotunda. K. K.

SALVIA foliis cordato -- ovatis, ferratis,
rugosis: bracteis sub verticillis florum
fenis: calyci bus tridentatis. Tab. 24

EX feminibus miscellaneis orta est hæc planta in nostro Horto Patavino, eaque ad insignem virum Julium Pontederam transmissa fuit sub hoc nomine, CHIA ALTERA: qui ob odorem CHIAM ALTERAM PSEUDO — ASPHALTITEM appellare consuevit. Sed quum animadverterim, falso admodum nomen Chiæ huic plantæ inditum fuisse, ideo eandem ad Salviz genus referendam esse censui.

Radix ramosa, fibrosa, subfusca. Caules erecti, pedales, tetragoni, obtusi, striati, pilis albis deorsum reflexis vestiti.

Rami

Rami oppositi, cauli similes, sed breviores.

Folia opposita, cordato-ovata, serrata, petiolata, rugosa, utrinque subhirsuta.

Spica oblonga, verticillis pluribus parum a se distantibus donata, & sub unoquoque verticillo sex bracteis instructa, quorum duæ laterales lanceolatae longitudine petioli florum, aliae autem breviores subulatae.

Calyces striati, & in singulis verticillis superioribus plerumque sex, in inferioribus autem etiam duodecim nonnumquam repertiuntur: quorum, juxta longitudinem dissectorum, dimidium superius colore nigro-violaceo inficitur, inferius autem viridi; iique pilis gutta nigra viscosa terminatis praediti; ore vero tridentati, compressi, acuti, dente superiore sursum reflexo, inferioribus duobus acutis.

Corolla bilabiata, caerulea: limbo, longitudine calycis: labio superiore brevior, obtuso, emarginato: inferiore trifido, segmentis lateralibus brevioribus, subrotundis; medio majore, patente, subbifido, basi maculis duabus pallidis notata.

Filamenta duo ex fauce corollae prodeuntia, ut in praecedente, sub labio superiore recondita. Antherae lineares, caeruleae.

Germen quadrifidum. Stylus filiformis, longitudine & situ staminum. Stigma bifidum, reflexum, paullulum extra corollam prominens.

Semina quatuor ovata, subfusca, supra convexa, subtus angulata.

Tota planta bitumen redolet.

Hospitatur in caldario biennis.

Ubi inventa sit haec planta, me prorsus later: nisi nomen Chiae ipsi impositum, ex Insula Chio eam fuisse delatam, suspicionem aliquam inducere possit.

A. Flos cum calyce. B. Calyx. C. Corolla, seu flos. D. Calyx apertus. E. Calyx cum flore antea visus.

TEUCRIUM foliis ovato -- crenatis, sub-
hirsutis, petiolatis, caulibus spica fla-
vescente pilosa terminatis. Tab. 3.

TEucrium hoc, cujus descriptionem aggredimur, apud nullos Auctores neque descriptum, neque pictum invenitur. Ejus semina missa sunt pluribus ab hinc annis e longinquis regionibus ad hujus Horti Praefectum, quem honoris causa nomino, Julium Pontederam, qui, ut unusquisque audire potuit, **CHAMÆDRYM FLORE LUTEO** appellare consuevit.

Verum accuratiori instituto a me examine, quum novam plantæ speciem eam esseprehenderim, ad Teucrii genus revocandam, ejus descriptionem & figuram tradendam curavi.

Quanam ex regione ad nos ea pervenerit, ut verum fatear, prorsus ignoro.

Caules pedales, atque etiam altiores habet, inflexos, ut plurimum, ex una radice prodeuntes, quadrangulos, subhirsutos, nodis distinctos, angulis tamen ita obtusis, ut teretes fere appareant.

Folia ovato -- crenata, subhirsuta, subtus subincana, supra viridia, splendentia, breviter petiolata, bina ac bina, semper inter se decussatim opposita.

Summi caules spica terminantur florum conferta, villosa, e viridi flavescente, tot bracteis linearibus instructa, quot floribus; bractea vero eo ordine ab uno eodemque puncto enascuntur una cum florum petiolis, ut bractea deorsum vergant. (vid. fig. 1. a.)

Calyx monophyllus, quinquesidus, quasi bilabiatus, inferiori parte gibbus, (vid. fig. 1. B. B.) in quinque inaequales lacinias divisus: lacinia superiore (c.) latiore, cordata, sursum reflexa: lateralibus duobus brevioribus, obtusioribus, (D.) inferioribus acutioribus, sursum incurvatis E.

Corolla monopetala, ringens (vid. fig. 2. 3. 4.).

STYL

STYL

Tubus,

Tubus brevis . g. g. g. Labium superius erectum , acutum , ultra
 basim profunde bipartitum (h) : Labium inferius patens , trifidum ,
 laciniis lateralibus obtusis ; media majore , subrotunda , concava .
 (I. I. I.)

Filamenta quatuor (vid. fig. 2. 3. L. L.), quorum duo breviora ,
 subulata , labio superiore corollæ longiora , interque ejus divi-
 suram posita , incurva , prominentia . Antheræ parvæ .

Germen quadripartitum . Stylus filiformis , situ & magnitudine
 flaminum . Stigma bifidum .

Semina quatuor subrotunda .

TEUCRIUM foliis cordatis, crenatis, petio-
 latis, spicis oblongis densissimis, ex
 Hircania . Tab. 4. Martini
 Comment. Gott. 1752.

Quoniam de Teucris sermo incidit , operæ pretium me factu-
 rum putavi , si raram hanc & pulcherrimam Teucris speciem , quæ
 in Horto hoc nostro Patavino colitur , descripsissem , ejusque iconem
 exhibuissem , licet a Clarissimo Martino in commentariis Gottingen-
 sibus anni 1752. ejus figura & descriptio tradita fuerit , ut refert
 præstantissimus Hallerus in sua Enumeratione Plantarum Horti Re-
 gii & Agri Gottingensis pag. 315. , qui inter Chamædres Teucris
 hoc collocavit . Hoc autem eo magis ad faciendum adducor , quod
 intelligam Commentarios Academiae Gottingensis apud nos adeo fa-
 cile non reperiri , & idcirco hanc plantam non omnibus nostris Bo-
 tanicis posse innotescere .

E perenni repente radice surgunt caules sesquipedales , & bipeda-
 les , quadranguli , & quasi rotundi , brachiati , molliter hirsuti , purpu-
 rei , emittentes folia invicem opposita , in caule alternatim sita , cor-
 dato-elliptica , rugosa , crenata , petiolata .

Rami ex alis foliorum undique assurgunt , ita ut tota planta ces-
 pitosa sit ; singuli tandem caules longæ & densæ spica terminantur ,
 florum

florum confertissima, purpurea, pyramidata, tot bracteis linearibus, quot floribus donata. Eo ordine bractez & florum petioli e communi puncto enascuntur, ut florum omnium petioli situi sint supra bracteis (vid. fig. 1. A.)

Calyx monophyllus, inferne gibbus. (vid. fig. 1. 2. B. B.)

Limbus bilabiatus, quinquepartitus, uno segmento superiore sursum verso, eoque cordiformi, majori, mucronato (vid. fig. 1. 2. C. C.) lateralibus obtusis, D. inferioribus rectis, acutis. E.

Corolla monopetala, ringens (vid. fig. 3. 4.) * Tubus brevis, labium superius ultra basim profunde bipartitum F. ; laciniis lunulatis acutis (g.g.g.) Labium inferius patens, trifidum: laciniis lateralibus parvis, obtusis: media majore, subrotunda, concava (vid. fig. 3. 4. h. h.)

Filamenta quatuor, ut in superius descripto.

Semina quatuor parva, rotunda, rugosa, fusca, sede circulo subalbido notata. (vid. fig. 5.)

Floret Mensibus æstivis, autumnali vero tempore semen perficit.

CHELONE foliis inferioribus ovato -- acuminatis, petiolatis, integerrimis: superioribus amplexicaulibus, lanceolatis, dentatis: corollis patentibus, bilabiatis. Tab. 5.

S Tirps hæc, quam descripturus sum, per plures annos in Horto hoc nostro alta fuit atque educata, eaque modo **PSEUDO-DRACOCEPHALUM**, modo **PSEUDO-DODARTIA** appellabatur.

Verum quum modo indicata nomina nullo modo huic plantæ convenire posse mihi viderentur, eam quoque ad trutinam revocare volui, idque quum magna adhibita diligentia fecissem, depren-
di, eam, si ad ullum genus referri posset, ad Linnæi Chelones esse amandandam. Quod si hæc plantæ species a Linnæo observata umquam fuit, ea profecto nulla alia esse potest, quam species tertia

ab

ab eodem descripta, quæque multum cum nostra convenire videtur. Verum, si quod sentio fateri debeo, summopere vereor, ne Linnæus hanc stirpem virentem viderit, imo dubito, virum Clarissimum e specimine sicco eandem descripsisse, quod de multis stirpibus fecisse ipse quoque fatetur. Si enim eam examinare potuisset, in suo libro, quem NOVA GENERA PLANTARUM inscripsit, characteres omnes peculiare nostræ hujus plantæ adnotasset, quos ipse omisit, ut videre est in descriptione tum Chelonis Linnæi, tum nostræ. Quam ob causam facile adducerem ad credendum, Linnæum, quum tertiam Chelonis speciem descripsit, hujus nostræ non valde dissimilem describere voluisse. Hoc autem dubium meum eo magis confirmatur, quod idem vir Clarissimus pro synonymo non dedit eam plantam, quam DRACOCEPHALUM LATIFOLIUM LYSIMACHIE LUTEÆ FOLIIS vocavit Morisonus in Hist. 3. pag. 407. Sectione 2. Tab. XXI. fig. 2., quæ certe eadem est cum nostra, ejusque figura a Morisone tradita satis elegans, quantum a specimine sicco unquam fieri potest, exhibetur. Sed quum capsula hujus plantæ desit, nec descriptio, ob non visam virentem plantam, perfecta sit, eam illustrare, & Morisonianum laborem in majori luce collocare decrevi.

Radix perennis, repens, fibrosa, alba.

Caulis sesquipedalis & altior, rotundus, levissime hirsutus, inferne purpureus, superne viridis, brachiatus.

Folia inferiora ovato - acuminata, integerrima, petiolata, subtus interdum purpurea: petiolis ex continuatione foliorum usque ad basim alatis: caulina folia ovato - lanceolata, opposita, amplexicaulia, denticulata, utrinque glabra.

Ramuli terminantur pedunculo fere dichotomo: in prima dichotomia flores plerumque bini, propriis pedicellis.

Calyx (A. A.) monophyllus quinquepartitus: laciniis subæqualibus lanceolato - ovatis, parum reflexis (B. B.).

Corolla monopetala, ringens, (C. C.) pallide purpurea, externe subhirsuta. Tubus vix calyce longior, (D. D.) collo attenuatus, (E. E. D. D.) basi utrinque gibbosus. (F. F.) Faux inflata, oblonga, supra & infra gibbosa, (G. G.) interna parte inferiore barbata, striis purpureis notata. Limbus bilabiatus, patens:

La-

Labium superius (H. H.) erectum, bifidum, obtusum. Labium inferius (I. I.) superiore latius, trifidum, paullo longius: laciniis ovatis, intermedia minore.

Filamenta quatuor, sub dorso corollæ recondita, quorum duo lateralia fauce extantia, (K. K.) Antheræ ovatæ, didymæ, coloratæ, inter se invicem oppositæ, labio superiori incumbentes (L. L.). Rudimentum quinti filamenti intra tubum corollæ parti gibbosæ superiori affixum, (M. M.) extremitate pectinatum (N. N.), deorsum inclinatum, in fauce labii inferioris reconditum (O. O.).

Germen ovatum; Stylus brevis. Stigma obtusum.

Capfula ovata, purpurea, apice acuta, pungens, bilocularis, bivalvis, calyce longior (P. P.)

Semina plurima, angulata, fusca. (q.).

CLYPEOLA perennis, foliis inferioribus petiolatis, cordato--angulatis: superioribus amplexicaulibus, lanceolatis: filiculis unilocularibus, maximis, pendulis, monospermis. Tab. 6.

Planta hæc, de qua disturi sumus, si Linnæanum Systema spectemus, jure ac merito Clypeolæ nomen vindicare sibi videtur. Juxta enim Tournefortium ac Boerhaviu, ad Jonthlaspi genus referenda esset.

Ea a nullo usque adhuc Auctore diligenter considerata fuit.

Ejus tantummodo iconem, sed rudem illam quidem & imperfectam, primus omnium exhibuit Lobelius icon. 129. cui **THLASPI PANNONICUM** nomen dedit. Post Lobelium descriptionem, & figuram tradidit Carolus Clusius in Hist. 2. pag. 130., nulla mentione facta Lobelii, ex quo, ut unusquisque videre potest, iconem omnino decerpfit, & **THLAPSI MONTANUM** 1. appellavit.

Caspar

Caspar Bauhinus nomina a vetustioribus Auctoribus huic plantæ indita pro Synonymis dedit, eamque in suo Pinace vocavit *THLASPI MONTANUM GLASTIFOLIUM MAJUS*. pag. 106.

Chabræus in stirp. icon. pag. 293. appellat *THLASPI FOLIO ALIARIÆ FLORE NASTURTII AQUATICI, ALBO, QUADRIFOLIO*. Morisonus denique iconem exhibuit prorsus similem ei, quam Clusius tradidit, & descriptionem eandem Clusii, paullum nomine mutato. *THLASPI MONTANUM MONOSPERMUM GLASTI FOLIO ABSQUE SEPTO MEDIO*, in Hist. 2. pag. 298. sectione 3. tab. 18. fig. 34. dixit.

Verum cum icones & descriptiones ab Auctoribus usque adhuc recensitis memoriæ proditæ, non sint satis accuratæ, iconem & descriptionem novam tribuam, & ad proprium genus revocabo.

Clypeola hæc plures ex eadem radice, perenni, tenui, albida, fibrosa, repente, caules profert reclinatos, pedales & altiores, glabros, in summitate ramosos, quos folia alterna serie vestiunt, quorum inferiora (num. 1.) cordato — angulata, petiolata, per margines raris & exiguis denticulis albidis obsita; superiora vero (num. 2. 3.) amplexicaulia, lanceolata, integra, subcarnosa, lævia, superne viridia, inferne subincana, lepidio glastifolio C. Bauhini similia, sed minora, odore propemodum allii, qualia sunt etiam ea, quæ statim a radice prodeunt.

Flores in summis caulibus, & ramulis enascuntur initio plures, congesti, deinde laxius dispositi, albi, tetrapetali, petalis æqualibus, subrotundis, concavis. In florum medio stamina sex, antheris simplicibus.

Calyces tetraphylli, decidui, foliolis ovato — oblongis; filiculis suborbiculatis, maximis, membranaceo — foliaceis, compressis, pendulis; monospermis, unicum in ipso centro continentibus semen, flavescens, gustu amaro & acri.

Majo mense floret, Junio, & Julio semen maturat.

Invenitur in umbrosis locis Shihenstiem, & qua itur ex ea arce ad Seneberg; nusquam alibi a Carolo Clusio observata fuit.

Ad nos ex alpibus Germanicis deferitur.

A. Flos cum calyce anterieus visus.

B. — idem a latere visus.

C

C.

C. Pistillum cum staminibus.

D. Silicula.

E. Semen.

ALYSSUM caulibus frutescentibus, paniculatis, foliis lanceolatis incanis, margine leviter sinuato--undulatis, capsulis compresso--orbiculatis, bilocularibus, tetraspermis. Tab. 7.

Non memini hanc Alyssi speciem vel descriptam, vel pictam observasse, nisi sit THLASPI LUTEUM LEUCOJI FOLIO Bocc. mus. 2. p. 78. Tab. 93. Sequentem in modum ab ipso describitur: *Alza questa pianta una spanna da terra, e trovasti nelle montagne di Norcia.* Hæc sunt quæ de hac planta memoriæ prodita sunt. Sed quum hæc descriptio sit nimium brevis, ejusque figura mala, ideo, quoad potero, plantam hanc illustrabo. Pro synonymis vero ejus mihi sunt ALYSSON CRETICUM SAXATILE, FOLIIS UNDULATIS, INCANIS, Tourn. coroll. 15. ALYSSON FOLIO LEUCOJI INCANO, FLORE LUTEO; Boerh. lugdb. p. 3. ALYSSUM FOLIIS LANCEOLATIS, INTEGERRIMIS, RADICIBUS CAULESCENTIBUS. Royen. lugdb. 332. n. 6. ALYSSUM CAULIBUS FRUTESCENTIBUS, PANICULATIS, FOLIIS LANCEOLATIS, UNDULATIS, INTEGERRIMIS, Linn. Spec. plant. 650. n. 4.

Radicem habet subalbicantem, pollicem crassam, ramosam, ex qua erumpunt caules palmares fruticosi, diffusi, inferne & superne attenuati, in medio vero incrassati, squamosi: squamæ & crassities quædam, ubi anno fuerunt ante elapso folia, apparent: in extremitate caulium ramorumque multa circumferuntur folia, incana, ovato—lanceolata, per margines parum sinuata: prominentiæ sinuum interdum quodam denticulo exiguo notatæ sunt, inter folia surgunt cauliculi palmares subincani, superne alternatim ramosi, foliolis

liolis lanceolatis integerrimis, alternatis, sessilibus industi.

Flores in summis caulibus & ramulis enascuntur, initio subumbellati, deinde paniculati, lutei, tetrapetali, petiolati, petalis æqualibus, subrotundis, patentibus: unguis petalorum calycis altitudinem metiuntur.

Calyces tetraphylli, externe hirsuti, decidui: foliolis quibusdam ovato — oblongis, obtusis, coloratis præditi, senis staminibus instructi, quorum duo opposita paullo breviora, gibba, vel denticulo introrsum basi inserto sunt donata. Pistillum brevi crescit in fructum orbiculatum, compressum, bilocularem, dissepimento membranaceo, valvulis hemisphæricis.

Semina quatuor compressa, margine membranaceo cincta, in centro pericarpium recondita.

Tota planta incana, & levissime tomentosa est; si vero lente vitrea inspiciatur, observatur setis minimis stellatim positis dense testâ.

A. Capsula integra.

B. — eadem aperta.

C. Semina

LEPIDIDIUM foliis inferioribus alternato -- pinnatis; pinnulis femicordatis, carnosiss, glaucis: superioribus sessilibus, dentatis, apice ovatis. Tab. 8.

Rarissimam exhibeo Lepidii speciem, de qua nullam plane mentionem apud rei Herbariæ scriptores reperire datum est.

Radice nititur bienni alba, crassiuscula, paucis fibris donata.

Caules inde surgunt pedales, teretes, levissime hirsuti, lignosi, ramosi: rami initio erecti, deinde flexuosi, & sine ordine diffusi.

Folia radicalia plurima, humisparia, crassiuscula, glauca, impari — pinnata: pinnulis alternatim integerrimis, sessilibus, deorsum vix

Stipula petiolo opposita (A. A.), lineari — lanceolata .

Spicæ axillares, oblongæ pedunculis glandulosis, petiolis foliorum duplo longioribus (B. B.).

Bractææ cordato — acuminatæ, limbo ciliatæ, deciduæ (C. C.).

Floris calyx (D. D.) monophyllus, tuberculis punctatus, quinque fidus: laciniis acutis, trinerviis, irregularibus.

Corolla papillonacea, pentapetala: Vexillum cœruleum, emarginatum, affurgens: Alæ albidæ, lunulatæ, obtusæ, vexillo breviores Carina dipetala, lunulata, obtusa, brevissima, apice cœrulea.

Filamenta decem in duo corpora coalita, quorum unum inferius germen involuit, alterum superius germini incumbit. Filamentum inferius, quod germen involuit, infra medium membranaceum, & cylindraceum est; longitudinaliter sursum dehiscit, atque inde in partes novem subulatas longitudine & flexura carinæ. Filamentum superius subulatum, rimam filamenti prioris cylindracei tegens, basi sua dehiscit a reliquis. Antheræ parvæ subrotundæ.

Germen lineare. Stylus subulatus, ascendens, longitudine staminum. Stigma obtusum.

Legumen longitudine calycis, apice compressum, ascendens, acuminatum.

Semen unicum reniforme.

Crescit in Regno Cilensi in America Meridionali.

E. Calyx cum legumine.

F. — idem cum flore a latere visus.

G. — idem antierius visus.

H. Filamenta.

I. Germen.

K. Legumen.

L. Semen.

Tota hæc stirps, referente eodem Fewillæo, vulneraria est, & cathartica. Incolæ regionis, in qua oritur, utuntur foliis adversus vulnera, cataplasmatibus forma vulneribus imponendo. Decoctio ejusdem dysenteriam sistit, ejusque radix in aqua infusa vomitum ciet. Complures etiam infusione cinerum utuntur tanquam cathartico.

BUPHTHALMUM caule erecto , unifloro :
 foliis amplexicaulibus , dentatis : inferioribus ovatis , obtusis ; superioribus lanceolatis , acutis . Tab. 12.

Hanc novam Buphthalmi speciem , quam leviter adumbratam exhibeo , in fummitatibus montium Brixienſium invenit unus ex noſtris Herbariis , eandemque duos ante hos annos ad me detulit . Quam ego ſtatim quum diligenter examinaviſſem , novamque Buphthalmi ſpeciem eſſe intellexiſſem , in Horto Patavino omni ſtudio colendam curavi . Verum , quod plerumque in his plantis contingit , ſub noſtro hoc cœlo brevi occidit . Quare ne hujusce ſtirpis figura & ſtructura ex memoria impoſterum elaberetur , quantum fieri potuit ex duobus fere ficcis ſpeciminibus ab Herbario ad me delatis , quæ penes me adhuc aſſervo , deſcripſi , atque ad magnitudinem naturalem delineavi . Nunc vero quoniam tulit occaſio , ut nonnullas ſtirpes a me inventas deſcriptasque typis committerem , hanc quoque Buphthalmi ſpeciem e tenebris eruere & in lucem proferre non inutile futurum exiſtimavi .

Radix perennis , fibroſa , ſubſuſca .

Caulis erectus , ſtriatuſ , piloſus , pedalis altitudinis , ex cujus ſummitate ſlos unicus luteus prodit .

Folia alterna , amplexicaulia , obſcure viridia , ſplendentia , venoſa , denticulata , pilis ciliata : inferiora ovata , interdum emarginata ; reliqua ovato — acuminata ; ſuperiora vero non amplexicaulia , ſed ſeſſilia .

Calyx communis duplicatus ; exterior foliaceus : foliolis lanceolatis ; lateralibus duobus majoribus : interior vero ſquamoſus : ſquamis lanceolatis , imbricatis , ciliatis , inæqualibus .

Reliqua fructificatio Buphthalmis Linnæi prorſus ſimilis ; exceptis tantum ſeminibus , quæ tam in hermaphroditis , quam in femininis ſolitaria , oblonga , ſtriata , parum compreſſa , margine integra , apice coronata .

A. Ca-

A. Calyx exterior foliaceus. B. Calyx interior imbricatus. C. Corolla. D. Flosculi, seu corollulæ hermaphroditæ. E. Semiflosculi, seu corollulæ femininæ ligulatæ. F. Semina.

ADMONITIO AD BIBLIOPEGUM.

In hoc libro icones singulæ inferendæ sunt suis locis
ut hic ordine notantur.

Infer. Icon.	Tab. 1.	pag. ix
	Tab. 2.	pag. x
	Tab. 3.	pag. xii
	Tab. 4.	pag. xiii
	Tab. 5.	pag. xiv
	Tab. 6.	pag. xvi
	Tab. 7.	pag. xviii
	Tab. 8.	pag. xix
	Tab. 9.	pag. xxi
	Tab. 10.	pag. xxiii
	Tab. 11.	pag. xxiv
	Tab. 12.	pag. xxvi

NOI REFORMATORI Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione , ed Approvazione del P. F. Gio: Paolo Zapparella Inquisitor Generale del Santo Officio di Venezia , nel Libro intitolato *Petri Arduini Veronensis Horti Publici Patavini Custodis Animadversionum Botanicarum Specimen M. S.* non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica , e parimente per Attestato del Segretario Nostro , niente contro Principi , e buoni costumi , concediamo Licenza a Gio: Battista Conzatti Stampator di Padova , che possi esser stampato , osservando gl' ordini in materia di Stampe , e presentando le solite Copie alle Publiche Librerie di Venezia , e di Padova .

Dat. li 28. Settembre 1759.

- (f. ALVISE MOCENIGO 4. Cav. Proc. Ref.
- (MARCO FOSCARINI Cav. Proc. Ref.
- (FRANCESCO MOROSINI 2. Cav. Proc. Rof.

Registrato in Libro a Carte 23. al Num. 137.

Gio: Girolamo Zuccato Segr.

Adi 3. Ottobre 1759.

Registr. nel Mag. Eccell. degli Efec. contra la Bestemia.

Gio: Pietro Dolfin Segr.





fig. 1.



fig. 2.



fig. 3.




fig. 4.





99 937223



99 937323



99 937300





9372


A B C
88




99 937306




99 937230



99 9375





99 9373



